

Instrucciones para Lavado Intestinal con NuLytely o GoLytely

**Por favor lea todas las instrucciones ahora.
No espere hasta el día antes de su colonoscopia.**

Preparación para la colonoscopia

- Si tiene alguna pregunta, por favor llámenos entre las 8:00AM y 3:00PM al **505-983-5631**.
- Por favor tome en cuenta que va a recibir **dos cuentas separadas** por este procedimiento – una del doctor/a (la oficina) y otra del centro de endoscopia (o del hospital). Si se toman biopsia/s, habrá una tercera cuenta por el examen de las muestras.
- Si usted necesita **cancelar o cambiar el día** su procedimiento por favor llame a la oficina al menos tres días antes. Si no cancela o no viene para su cita, se le cobrarán \$100.

Acerca del procedimiento

- Usted necesita a **alguien que lo traiga a su cita, esa persona se debe quedar en el centro de endoscopia (o el hospital) durante su procedimiento (2 o 3 horas) y luego transportarlo de regreso a su casa**. Al paciente no se le permitirá salir en taxi sin que una persona adulta le acompañe. Usted será sedado/a con medicina intravenosa y ésta impedirá su juicio y percepción hasta 24 horas después del procedimiento.

Medicamentos

- **Anticoagulante:** Si usted toma Coumadin, Plavix, Warfarin, Pradaxa, Lovenox, Heparin, etc., por favor consulte con su medico **al menos dos semanas antes** de su procedimiento para saber cuando dejar de tomarlas.
- **Pacientes diabéticos/as:**
 - Si usted toma **pastillas para la diabetes**, no las tome en la noche antes de la colonoscopia o en la mañana del día de la colonoscopia. Usted puede comenzar de nuevo a tomar esas pastillas después del procedimiento.
 - Si usted toma **insulina**, **la noche antes** de la colonoscopia debe de usar la mitad de la dosis regular. **El día del procedimiento** espere hasta después de la colonoscopia para usar su dosis regular de insulina.
- **Vitaminas:** No tome hierro ni vitaminas que contengan hierro, tampoco suplementos herbados como ginseng, ginkgo y ajo por los **5 días** antes del procedimiento.
- **Otras medicinas:** Continúe tomando pastillas para la presión, los riñones, o el corazón. Si tiene preguntas, por favor contacte el doctor/a que se las prescribe.
- **Sí puede tomar** acetaminophen o Tylenol para cualquier dolor que tenga.